



# දවල් නිදන රූ නොනිදන "ලෝරිස්"



ත්ව ලෝකය විවි-  
ධාකාර ය. එහි  
විවිධත්වය පරිස-  
රය වමන්කාරජ-  
නක ස්ථානයක් බවට පත්  
කරන්නට ප්‍රබල මෙහෙයක්  
ඉටු කරනු ලබයි. සත්ව  
ලෝකයේ ක්ෂීරපායී සතුන්  
අතරින් විශාලතම සත්වයා  
පිළිබඳ වාද විවාද  
නොමැත. එහෙත් ඉතා ම  
කුඩා නැතහොත් අඟල් 7 -  
8 පමණ විශාලත්වයකට  
හිමිකම් කියන සුන්දර  
ක්ෂීරපායී සතෙකු පිළිබඳ  
උදම් අනන්තව හැකියාව  
ඇත්තේ ලෝකයේ රටවල්  
පන්සියයකට පමණි.

## වමිමික මල්ලවආරච්චි

එකී රටවල් අතරට පුංචි ශ්‍රී  
ලංකාව අන්තර්ගත වීම අපට ද  
පුංචි ආධිමිබරයකි. අතෙක් අතට  
කුඩා වූවත් සත්ව හා පාරිසරික  
වශයෙන් ඉතාමත් වටිනා මෙකී  
කාරණය යි. අතීතයට වඩා අනාග-  
තයේදී වඳවීමේ තර්ජනයට ලක් වී  
තිබෙන සත්ව කණ්ඩායමක් වශ-  
යෙන් ද හැඳින්විය හැකි ය. මෙලෙස  
වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්වෙමින්  
සත්ව ලෝකය තුළ වඩා වටිනා-  
කමක් හිමි කර ගත් සත්ව විශේෂය  
ලෙස "ලෝරිස්" (Loris) හඳුන්වා දිය  
හැකි ගැමි ජනයා අතර ඉතාමත්  
ප්‍රසිද්ධත්වයට පත් වී තිබෙන  
"ලෝරිස්" ඔවුන්ගේ හැඳින්වීමට  
අනුව "උණ හපුළුවා" ලෙසින්  
ආමන්ත්‍රණය කරනු ලබයි. ගැමියන්  
හා "උණහපුළුවා" අතර පවත්නා

සහ සම්බන්ධතාවන් ගැමි සාහිත්‍යය  
තුළින් මොනවට පැහැදිලි වේ. එයින්  
ද, "උණ හපුළුවාගේ කඳුළු" සහ  
"උණ හපුළුවාගේ පැටවු මෙන්" එහි  
කියමන් ගැමියන් අතර නූතනයේ ද  
ඒවමාන කියමන් වේ.  
සත්ව විද්‍යාඥයින්ට අනුව මානව  
පරිණාමය මෙන් "ලෝරිස්" පරිණා-  
මය ද ඉතාම ඈත අතීතයට නැදැකම්  
කියන්නකි. පොදුවේ ප්‍රාථමික ක්ෂී-  
රපායී සතුන් සත්ව විද්‍යාත්මකව  
"ලෙමුර්" (Lemur) යන පොදු  
නාමයෙන් හඳුන්වනු ලබයි. මෙලෙස  
ප්‍රාථමික ක්ෂීරපායී සතුන් හැඳින්වීම  
සඳහා උත්සාහ ගැනීමට හේතු කිහි-  
පයකි. මොවුන් ඉතාමත් නිශ්ශබ්ද  
සේ ම ගමන් කරන විට කිසිදු හඬක්  
නොනැගීම ප්‍රධාන වශයෙන් දක්විය  
හැකි ය. මේ අතරින් වඳුරන්, ඒජස්

වඳවීමේ තර්ජනයට  
ලක්වෙමින් සත්ව  
ලෝකය තුළ වඩා  
වටිනාකමක් හිමි කර  
ගත් සත්ව විශේෂය  
ලෙස "ලෝරිස්" හඳුන්වා  
දිය හැකි. ගැමි ජනයා  
අතර ඉතාමත්  
ප්‍රසිද්ධත්වයට පත් වී  
තිබෙන "ලෝරිස්"  
ඔවුන්ගේ හැඳින්වීමට  
අනුව "උණ හපුළුවා"  
ලෙසින් ආමන්ත්‍රණය  
කරනු ලබයි.

සහ මිනිසුන් Order  
Primates) සත්ව කණ්ඩායමට  
අයත් වේ. "ලෝරිස්" ලාගේ ශාරීරික  
ලක්ෂණ සහ සෛෂ්‍ය වර්ණ ලක්ෂණ  
අනුව ඔවුන් වර්ග හෙවත් විශේෂ  
දෙකකට බෙදා දැක්විය හැකි ය. පළමු  
විශේෂය Lorisiformes වන අතර  
එම කණ්ඩායමට අයත් සතුන් වශ-  
යෙන් ලෝරිස්  
(Loris) පොටෝ (Potto) සහ  
ගලාගෝ (Galago) ලෙසින් ද  
දෙවන විශේ-  
ෂය (Lemuriformes) වශයෙන්  
ද සඳහන් කළ හැකි ය. මෙම විශේ-  
ෂයට සිපාකා (Sifaka) aye aye  
Indri සහ avani වැනි සත්ව කණ්-  
ඩායම් අයත් වේ.  
පොදුවේ ගත්විට ත්‍රිශාචර සත්ව  
කොට්ඨාශයක් වන ලෝරිස් වර්ග  
කිහිපයකි. සත්ව ලෝකය තුළ දී  
යොවුන් Slender Loris සහ Slow  
Loris වශයෙන් මොවුන් හඳුන්වනු  
ලබති. විශේෂයෙන් ම Slender  
Loris ගේ නිශ්ශබ්ද ශ්‍රී ලංකාව සහ  
දකුණු ඉන්දීය ප්‍රදේශ වශයෙන් සඳ-  
හන් කළ හැකි ය. මෙම විශේෂය  
ලෝකයේ වෙනත් කිසිදු ප්‍රදේශ-  
යකින් සොයා ගැනීමට වර්තමානය  
දක්වාම නොහැකි වීම

ශ්‍රී ලාංකීකයන් වන අපට ද ආධිමිඛර විය හැකි සුවිශේෂී තත්ත්වයකි. තවද, Slenter Loris එක් විශේෂයක් පමණක් දැකිය හැකි වුවත් Slow Loris විශේෂ කිහිපයකි. මොවුන් සත්ව විද්‍යාත්මකව Nycticebus Coucang සහ Nycticebus Pygmaeus ලෙසින් හඳුන්වා තිබේ. මෙකී "ලෝරස්" සත්ව විශේෂ දෙකම දකුණු නැගෙනහිර ආසියාවේදී හා මාලදිවයින තුළ දී පමණක් දකගත හැකි ය.

පළමු විශේෂය නම් Slenter Loris කුඩා නිශාවර සත්වයෙකි. ඇතැම් විට ලේනෙකුට (Squirrel) වඩා කුඩා ස්වරූපයක් ගනී. මොවුන්ගේ ශරීරය අගල් 7 - 8 ගණන දිග වේ. තවද මොවුන්ගේ පාද සහ අත්වල ඇඟිලි පහක් දැකිය හැකි අතර ම ඉතා හොඳින් වැඩුණු නිය කැපී පෙනේ. නිය නියා ගස් මත නොවැටී දැඩිව අල්ලා ගැනීමට මහත් උපකාරී වෙයි. මේ සමගම Slenter Loris ගේ මතක ශක්තිය (Memory Power) සුවිශේෂී ලක්ෂණයකි. එනම් සත්ව විද්‍යාඥයන්ට අනුව මොවුන්ට සීතල මොළයක් පිහිටා තිබේ. එහෙත් ගඳ සුවද දැනීම ඉතාම දුර්වල තත්ත්වයකි. කෙසේ වෙතත් ඉතා ම විශාල සහ තියුණු ඇස් පිහිටා තිබීම සෙසු සමීරපායී සතුන්ට වඩා පහසුවෙන් ගොදුරු අල්ලා ගැනීමට "ලෝරස්" ලාට පහසු කටයුත්තකි. එනම් විශේෂයෙන් ම මොවුන්ගේ දෑස් වෙතින් ආලෝක සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වීම සුවිශේෂී තත්ත්වයකි. තවද, ඉතාම විශාල ඇස් සමීපව පිහිටා තිබීම තුළින් ගොදුරක් දුටු විගස නිවැරදිව තීරණය කර ගැනීමට මෙන්ම ගොදුර වෙතම තෙත් යොමු කිරීමට ද හැකියාවක් තිබේ.

කෙසේ වුවත් සෙසු සමීරපායී සතුන් මෙන් නොව ලෝරස්ලාගේ පෝෂණය රටාව ද වෙනස් ස්වරූපයක් ගනී. Slenter Loris ගේ ආහාර දමය විවිධාකාර ය. සත්ව විද්‍යාඥයින්ගේ මතය නම් විවිධාකාර Slenter Loris විසින් ප්‍රයෝජනයට ගන්නා බවයි. එහෙත් සාමාන්‍යයෙන් මොවුන් මස් සහ ශාක වර්ග ආහාරයට ගන්නා Omnivores සතුන් ලෙස පිළි ගනී. එහෙත් ශ්‍රී ලංකාවේ වාසය

කරන Slenter Loris ප්‍රධාන වශයෙන් කෘමීන් පමණක් ආහාරයට ගන්නා බවට මතයක් පවතී. එම නිසා මොවුන් Insectivores ලෙසින් නම් කිරීමට සත්ව විද්‍යාඥයන් කැමැත්තක් දක්වන බව ඔවුන්ගේ වර්තන තුළින් කැපී පෙනෙන සුවිශේෂී ලක්ෂණ-



සෙසු සත්වයන්ට හාත්පසින් ම වෙනස් ලිංගික ක්‍රියාවලියක් පැවැත් බෝ කිරීම සඳහා ලෝරස්ලා විසින් අනුගමනය කරනු ලබයි. සත්‍ය වශයෙන් ම ලෝරස්ලා සඳහා ලිංගික කාර්යන්ට නියමිත රටාවක් නොමැති බව පැවසීම නිවැරදි ය. කෙසේ වුවත් මොවුන්ගේ ලිංගික කාර්යය සඳහා විනාඩි 300 ක පමණ කාල අවශ්‍ය වේ.

එ අනුව Slenter Loris විසින් තණකොළ පෙත්තන්, මී මැස්සන්, වේයන් සහ සමතලුන් වැනි සතුන් කැලෑ තුළ දී ආහාරයට ගනු ලබයි. තවද, පුංචි කුරුල්ලන්, කටුස්සන්, ගස් ගෙම්බන් වැනි සතුන් ද ගොදුරු කර ගත් මුත් කිසිම විටෙක කුඩා සමීරපායී සතුන් ආහාරයට නොගනී. මේ සමගම මිදි, අඹ, ගස්ලඬු, කෙසෙල් ගෙඩි, වැනි පලතුරු ද දකුණු ඉන්දීය Slenter Loris ගනු ලැබූව ද ශ්‍රී ලංකාවේ දී දැකිය හැක්කේ ඔවුන් වරකා පමණක් බුදින ලෝරස්ලා පමණකි.

මගේත් "ලෝරස්" පොදු සත්ව කණ්ඩායමේ දෙවන විශේෂය වන Slow Loris ගේ ජීවන ඔවුන්ට Slenter Loris ට වඩා හාත්පසින් ම වෙනස් ස්වරූපයක් දැකිය හැකි ය. විශේෂයෙන් ම Nycticebus Coucong Slow Loris ගේ ශරීරය කුඩා භාවකට සමාන වන අතර ම හිසේ සිට ශරීරය අගල් 10 - 5 - 15 අතර ප්‍රමාණයක් වේ.

සාමාන්‍ය බර කිලෝ ග්‍රෑම් 1.5 ප්‍රමාණයක වන බවට මත බොහොමයක් තිබේ. මොවුන්ගේ එම ලක්ෂණයටත් වඩා වැදගත් වන්නේ ශරීර වර්ණය වේ. එහි ශරීරය පුරා අළු පැහැති මිශ්‍ර සුදු වර්ණයක් දැකිය හැකි අතර ඇස්වටා තද පැහැති රවුම් හෙවත් රටා වලලු ඉතාමත්

සිත්ගන්නා සුළුයි. මෙවැනි ලක්ෂණ ගනු ලබන Slow Loris දකුණු නැගෙනහිර ආසියාවේ සහ බටහිර ඉන්දුනීසියාවේදී දැකිය හැකි ය. තවද, මොවුන්ගේ ජීවන රටාව ඉතාමත් සිත් ගන්නා සුළු ය. එනම් සෙසු සත්වයන් මෙන් නොවුවත් මොවුන් රාත්‍රී කාලය තුළ දී පමණක් ක්‍රියාශීලී වීම නිසා ය. කෙසේ වුවත්, පොදුවේ මොවුන් තනිව වාසය කරන අතර ආහාර සොයා ගැනීම පිණිස ඉතාමත් සෙමින් අතු පතර සංචාරය කිරීම දකගත හැකි ය. විශේෂයෙන් ම සර්මකලාපීය හරිතාගාර වනාන්තර තුළ දී දක ගැනීමට හැකි වීම සුලබ තත්ත්වයකි. එහෙත් Slenter Loris ට වඩා ප්‍රධාන වශයෙන් මොවුන්ගේ අහාර ගැනීම වෙනස් වේ. එනම් පිළිතුර මත යැපීමට ඉතාමත් තදපටු රුචිකත්වයක් දක්වති. එහෙත් ඉතාම කලාතුරකින් හෝ කෘමීන් සහ කුරුල්ලු බිත්තර ගිල දැමීමට ද රුසියෝ වෙති. සත්ව විද්‍යාඥයන්ට

හා පර්යේෂකයින්ට අනුව පොදුවේ ලෝරස්ලාගේ වර්තන ලක්ෂණතා හඳුනා ගැනීම ඉතාම අපහසු කාර්යයකි. මුළු රාත්‍රීය පුරා ම ආහාර සොයමින් ගමන් ගන්නා මොවුන් විශේෂයෙන් ම පිරිමි සතුන් බොහෝ තිට ගැහැනු සතුන් කිහිප දෙනෙකු සමග ලිංගිකව හැසිරීම සුලභ දර්ශණයකි. බොහෝ නිශාවර සතුන් මෙන් ලෝරස්ලා ද මුහුණ සලකුණු මගින් අතෙක් ලෝරස්ලාට ලිංගික කාර්යයක් සඳහා යම් ඉඹියක් ලබා දෙනු ලබයි.

එහෙත් Slow Loris විශේෂයෙන් දෙවන කොට්ඨාශය වන Pygmy Slow Loris සහ Slow Loris අතර වෙනස්කම් රාශියක් දැකිය හැකි ය. ඔවුන් දඬු-ලේනකුගේ ශරීර ප්‍රමාණය ගන්නා අතර දිග අගල් 6 - 10 අතර ප්‍රමාණයක් වේ. බර ප්‍රමාණය ඇතැම් විට කිලෝට්ටන් වඩා අඩු ය. මෙම වර්ගයේ ලෝරස් Slenter Loris වඩා ශරීර වර්ණය ඉතාමත් සිත්ගන්නා සුළු ය. සමේ පැහැය දීප්තිමත් තැඹිලි ගුරු පැහැයෙන් ගනු ලබයි. එහෙත් ප්‍රධාන වශයෙන් සඳහන් කළ හැකි කරුණක් නම් මොවුන් කුඩා සමීරපායී සතුන් ද ආහාරයට ගැනීම වේ. Pygmy Slow Loris ඉතාමත් කඩිසර ස්වාභාවයක් ගැනීම ද තවත් සුවිශේෂී කරුණකි. මොවුන්ගේ සෙසු ක්‍රියාකාරකම් Slenter Loris ට සමාන වුවද, රාත්‍රී කාලය පුරා ම නිසංසලව ගමන් කිරීම වෙනුවට කඩිසර කමින් ආහාර හොයා ගැනීම සුවිශේෂී කරුණක් වේ.

කෙසේ වුවත්, සුළු ලෝරස් විශේෂය නම ලිංගික වර්ගවත් පොදු ස්වාභාවයක් දැකිය හැකි ය. විශේෂයෙන් ලිංගික කාලසීමාවන් පැවැත් බිහි කිරීම, පැවැත් පෝෂණය ආදී කාර්යයන් තුළ දී මෙම ස්වාභාවය කැපී පෙනෙයි. සෙසු සත්වයන්ට හාත්පසින් ම වෙනස් ලිංගික ක්‍රියාවලියක් පැවැත් බෝ කිරීම සඳහා ලෝරස්ලා විසින් අනුගමනය කරනු ලබයි. සත්‍ය වශයෙන් ම ලෝරස්ලා සඳහා ලිංගික කාර්යන්ට නියමිත රටාවක් නොමැති බව පැවසීම නිවැරදි ය. කෙසේ වුවත් මොවුන්ගේ ලිංගික කාර්යය සඳහා විනාඩි 300 ක පමණ කාල අවශ්‍ය වේ.

# දවල් හිදුන රැ හොනිදුන...

36 පිටුවෙන්

සාමාන්‍යයෙන් තව පැටවෙකු බිහි කිරීම සඳහා දින 170 ක් පමණ කාලයක් පසු කිරීමට සිදු වේ. බොහෝ විට පැටවුන් බිහි කිරීම මාර්තු, අප්‍රියෙල් සහ මැයි යන මාස තුළ දී දැකිය හැකිය. සෙසු සත්වයන් මෙන් නොව ලෝරිස්ලා විවෘත ස්ථානයක දහවල් කාලයේ දී පැටවුන් බිහි කිරීම සිදු කරයි. තව පැටවා සති 5 - 7 කාල සීමාවක් සිය මව සමග වාසය කරන අතරම ශ්‍ය 2 - 3 කට පසුව කෙටි දුරක් සිය පැටවා මව විසින් ඔසවාගෙන යනු ලබයි. එමෙන් ම පුරුද්දක් ලෙස මව විසින් කුඩා පැටවාගේ පසු පස ගමන් කරමින් ඔවුන්ට ආරක්ෂාව සැපයීම සාමාන්‍ය ලක්ෂණයකි.

කුමන ආකාරයකට සටහන් කළත්, සෙසු සත්වයින්ට වඩා වැඩි විමේ තර්ජනයට මුහුණ පා සිටින සතුන් අතරින් ලෝරිස්ට හිමි වනුයේ ප්‍රමුඛ ස්ථානය යි. මෙ සඳහා සුවිශේෂී කරුණක් මැයෙන් සත්ව විද්‍යාඥයන් දක්වන්නේ සෙසු සත්වයින්ට වඩා මොවුන්ගේ ජීවන රටාව හොද වේ වෙනස් ස්වරූපයක් ගැනීම වේ. අනෙක් අතට ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව සහ මාලදිවයින ආදී රටවල් කිහිපයක පමණක් මොවුන්ගේ නිර්භූමිය වී පැවතීම ද වැඩි විමේ තර්ජනයට රැකුලක් වී තිබෙන බව යි. තවද, ඉන්දියාව මෙම සුළු රටකින් ම ප්‍රමුඛ ස්ථානය ගනු ලබයි. "ලෝරිස්" ශ්‍රී ලා ඉන්දිය වෙළඳුන්ට කදිම භාදයම මාර්ගයකි. ඉන්දිය වෙළඳුන් විසින් "ලෝරිස්" සුරතල් සතකු ලෙසින් ද ආයුර්වේද ඖෂධයක් ලෙසින් ද ඉන්දියන් සමාජයට හඳුන්වා දී තිබේ. එසේ ම ඔහු ආගමවාදී රටක් වන ඉන්දියාවේදී "ලෝරිස්" ගේ ඇස් යසා ඇස් ලෙස සලකා තබා ගැනීමට මිනිසුන් විසින් උත්සාහ ගැනීම ද "ලෝරිස්" ශ්‍රී ලා ස්වභාවධර්මය විසින් ලබා දුන් වැනි ය. කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් ආවේණික Slenter Loris රැක ගැනීමට හැකි සුළු පියවරක් ම ගැනීම අනාගත පරපුරට ලබා දිය හැකි ජෛව විවිධත්වයේ පරම ශේෂය ලෝරිස් විය හැකි ය. □